



D. O. M.
 DE CARIE OSSIUM.
 THESES
 ANATOMICÆ ET CHIRURGICÆ.



OMO naturæ miraculum & decus, non modò divinæ mentis, quâ informatur, arduâ sagacitate, verùm etiam eximiâ ædificii mortalis fabricâ, eleganti dispositione, nobili formâ, miro partium concentu ac singulari artificio, infinitam supremi numinis sapientiam arguit. Quàm amicè sociantur frontis dignitas, oris venustas, oculorum blandè minacium flagrantia! Quàm benè conveniunt, vultu, animæ theatro, sedentes majestas & amor! Stupendam microcosmi architecturam, fulcri modo sustentant ossa; his cæteræ partes affiguntur. Ossa concinnè invicem articulata, mutuâque contiguitate copulata, corpus, pro diverso humanæ indigentiae usu, flexile præstant, dum motus voluntarii organis, stabile

A

M

2

principium largiuntur. Ossa tandem, totius molis columnæ, seu suum regiam, ita erectam sustinent, ut homo,

. . . Os sublime ferat, cælumque tueri
Possit, & erectos ad sidera tollere vultus.

QUAMQUAM durissimæ deprehendantur ossæ partes, diræ tamen morborum cohorti, patescunt obnoxia. Nunc terribissimas patiuntur læsiones, nunc firmissima eorum substantia eroditur, consumitur, deperditur; quod à morbo edaci, *carie* dicto, calamitosè nimis demonstratur. De pessimo hocce affectu, nonnulla quædam dicere fert animus, postquam Ossium anatomiam, paucis exposuerimus.

E X A N A T O M I A.

CORPUS humanum, definitur à peritis, machina hydraulico-pneumatica, solidis ac fluidis partibus coagmentata. Primaria humanitatis nostræ rudimenta, sunt infinitè parva & abstrusa nimis, quàm ut de illis, sermo fieri possit. Itaque de elementis secundariis, quæ sub sensu cadunt, tantum modò dicemus.

FIBRIS diversi generis, multifariam implexis, intortis, intertextis, corporantur solida, id est, & vasa & quod dixere *parenchyma*. Ex moleculis diversimodè configuratis, conflantur fluida. A latice purpureo, seu fluido principe, defluunt alii humores, chilo excepto. Materia à vasis discrepans, primam efformat telam cujuscunque visceris, musculi, cartilaginis, ossis, &c. huic materiæ *parenchyma* nomen. Cæterarum partium, summam solum, primigeniam delibamus texturam, ut amplior, de Ossium compage, argumento præsentis, sermo habeatur.

IN osse, durissimâ ac firmissimâ ædificii humani parte, consideranda præcipuè veniunt elementa, forma, cavitates, medulla, vasa, periostium.

SENSILIA Ossium elementa, sunt laminæ ossæ, aliæ supra alias adplicatæ, & in hunc dispositæ modum, ut inferior, nunquam exactè tegatur à superiore. Mediante succo partim oleoso, partim glutinoso, inter sese junguntur. A periostio externo originem mutuari, aut à cartilaginibus seu membranis in substantiam osseam transformatis, produci videntur (a). in plerisque

(a) Ostéologie de M. Bertin, tom. 1, pag. 323.

3

ossibus, substantia triplex conspicua, scilicet *compacta*, *cellularis* & *reticularis*.

COMPACTA sive solida, externam præcipuè ossis superficiem occupans, durissima, albicans, textuque donata validissimo, diversis laminarum stratis componitur: quod invictè demonstrant ossa fracta, ossa per longum temporis spatium pluviae & aeris injuriis exposita, igne calcinata, aut in machinâ Papinianâ forti ebullitione subacta. Harum præsentiam, confirmant adhuc exfoliationes, aut lamellularum in vulneribus Ossium, abrasiones. Laminas detegit, ipsemet oculus microscopio armatus.

EXTERIORUM ordo, admodum regularis esse observatur; sed interiores pedetentim, quasi per gradus declinant; corrugatae, ut ita dicam, aut inæqualiter plicatae, rectam stratorum normam deserunt, ut lamellas efforment, quæ sese diversimodè interplicantes, cellulas plus minùs ve planas, curvas, intortas, angulares, irregulares, crassas, latas, graciles &c, relinquunt. Lamellæ constituunt portionem cellulosam, quæ secunda ossis substantia.

INTER hosce folliculos, deteguntur plurimæ aliæ fibrillæ pariter ossæ, sed tenuiores, quoquo versum posita, sese diversimodè interfecantes, substantiam efformant, speciem reticuli præ se ferentem, & idcirco reticularis audit. Hæc præcipuè, in magnâ Ossium longorum cavitare, reperitur.

EXTIMA illorum superficies à periostio, membranâ tensâ, subalbidâ & inæqualiter spissâ, cingitur. Omnia ossa externè & internè investit periostium, dentibus quantum supra gingivas prominent, locisque ubi inseruntur muscoli, exceptis. In foraminibus Ossium, plurimas mittit fibrillas, quæ in intimam usque substantiam penetrantes, vasa, os intùs & extùs aluentia, vehunt & sustinent. Fibrillæ nervæ in periostio copiosissimæ; hinc exquisita illius sensibilitas.

ARTERIÆ & venæ, innumeris anastomosibus, quasi reticulum efformant, ex quo variæ amplitudinis rami exurgunt. Majores, per foramina in medio osse & extremitatibus conspicua, sese insinuant. Minores, in angustissimos substantiæ compactæ recessus penetrantes, os nutriunt. Arteriæ in Ossium cavo per foraminula extremitatum distributæ, venas non habent comites: quæque arteria, vena quæque foramen peculiare subit, exceptâ solùm modò arteriâ, quæ, ad ductum in medio osse insignem, se confert.

LICET minùs in propatulo sint, oculosque ultimi ramuli fugiant, quot arteriæ in ossibus, tot venæ, in tres classes dividuæ.

PRIMÆ classis arterioliis periostii, secundæ classis venæ arteriis extremitatum, correspondent. E cavitate cellularum, redundantem revehunt sanguinem, majoresque periostii venas, aut venosos truncos viciniore adveniunt. Tertia classis venas complectitur, quæ in os medium penetrantes, arteriarum sociæ, in cylindro medullari, peculiari artificio distribuuntur, arteriarum enim venarum que ramuli, tametsi eosdem ductus subeant trunci, sese non concomitantur. Hæ venæ, majores periostii venas petunt.

MEDULLA est substantia pinguis, oleosa, subtilis, subalbida, quandòque sub flava aut subrubra, cui, varia, ratione consistentiæ & loci, denominatio. In majori Ossium cavitate, ubi substantiâ reticulari sustentata, coacervatur, *medulla*, in cellulis extremitatum, *substantia medullaris*, in interstitiis lamellarum, in textu que solidiori ossis, *oleum medullare*, nuncupatur. Ex arterioso sanguine, in membranulis cellulas Ossium circumdantibus, membranâque cylindrum medullarem cingente, pinguis hæcce substantia, secerni videtur. In fibrarum ossium intervallis sese insinuans, tenacitatem, flexibilitatem que ossibus conciliat, eaque ab ariditate & fragilitate defendit, sed ossa, ut existimarunt olim, non nutrit.

Sui sunt medullæ nervi, sua peculiaris membrana, suæ cellulæ seu vesiculæ, è periostii, canaliculos Ossium subeuntis, processibus, vasisque tenuissimis, sibi invicem adhærentibus, conflata.

FORMA, cavitates, &c Ossium, non sunt instituti præsentis.

EX CHIRURGIA.

CARIES (a) est erosio ossis, modò à causis internis, modò ab externis originem ducens.

(a) Varia est, varios apud auctores, cariei nominis acceptio. Quandòque corruptionem ligni aut aliarum rerum ex vetustate significat. Nam sic *Plinius*, lib. 16. *Histor. natur.* capit 39: *Cedri oleo peruncta materia, nec tineas nec cariem sentit.* Propriè quidem caries in lignis denominationem habuit, quandò à vermiculo, qui Græcè *κίς* vocatur, erosa fuere, postea autem omne vetustum *cariosum* audiit, quod testatur hic *Ovidii* versus:

Quid precer iratus? Nisi vos cariosa Senectus
Rodat?

Eadem vox postmodum à Chirurgis fuit usurpata, eamque significare volunt, substantiæ jacturam in partibus duris, à re corroderentem productam.

5

Os s i s perioftio defraudati , fubftantia brevi adulteratur , brevi à natali colore degener , flavum fit os , fufcum , tandemque nigrum ; tunc alteratio , nigrities offis (a) dicitur.

Si mirum in modum accreverit morbus , id eft , fi nigrities intenfius appareat ; tunc , caries immeritò vocatur , eft enim fecundus tantummodò morbi gradus.

Si lamellæ offeæ , lentè admodum confumantur , squammulæ exiguæ furfuraceæ decidant , fi os erofum , exefum , atque pumicis inftar inæquale deprehendatur , fi fanies fœtida profluat , cujus acrimonia , os ut plurimum potentiùs depafcitur , &c ; tunc morbus , meritò *cariæ* nomine infignitur.

LEVIS eft caries , aut adæquata , hæc in ficcam & humidam bipartitur. Sunt & adhuc quædam differentiæ à caufis , tum externis , tum internis , aliis ve circumftantiis , defumendæ.

CAUSÆ cariæ internæ , funt fpiña ventofa , arthritis , lues venerea , fcorbutica , fuccuffiones , commotiones , deliquescencia medullæ. Inflammationes membranæ , medullam internofque Offium patietes , investientis , huic quoque morbo januam fæpiſſimè aperiunt.

ICTUS , lapſus , abſceſſus , denudatio offis , contactus aeris , puris , ineptaque medicamentorum pinguium ſuper os applicatio , cauſæ habeantur externæ.

Viſu , tactu & naturâ humoris ex ulcere profluentis , cognofcitur caries.

Si os fideratum oculis ſubjaceat , flavum , fufcum aut nigrum deprehenditur. Quandò verò , pars offis adulterata deliteſcit , oculiſque conſpici nequit ; tunc digito aut ſpecillo , aſperitates aut inæqualitates perſentiuntur. Quandò denique cariem , neque viſus , neque tactus teſtantur , ſi carnes flaccidæ & decolores luxurientur , ſi linamenta carpta , emplaſtraque quaſi nigrefcant , humoresque , fuſci , nigri & fœtentes ex ulcere erumpant , fruſtulaque offea , aut ſquammulas ſecum advehant ; tunc cariem , dolofis ſuppoſitam carnibus , latere meritò ſuſpicamur.

PRO naturâ , intenſitate , loco , cauſâ & accidentibus differt cariæ prognofis.

CARIES à cauſâ externâ , ſuperficiem Offium validiorum rodens , eradicari poteſt. Major , immò maxima occurrit difficultas , quandò offa tenuia , aut minùs compacta , infeſtat. Quæ articulos

(a) Heiſteri Inſtit. Chir. tom. 1. pag. 369.

afficit, ferè nunquàm absque amputatione, aut saltem absque anchylosi, delerur.

PESSIMAM semper secum importat prognosim, caries ab internâ causâ, originem ducens. Quæ à spinâ ventosâ & ab archritide, ferè nunquàm, quæ à lue venereâ, aut scorbuticâ procedit, quandoque destruitur. Caries à succussionibus & deliquescentiâ medullæ oriunda, terebrationem ossis, sæpius, membri amputationem expostulat. Consequenter periculosissima.

RELIQVUM superest, ut gravissimi hujusce morbi, variam, pro variâ naturæ, sedis, causæ & gradus ratione, curationem summam aggrediamur, his potissimum indicationibus comprehensam. Scilicet, 1°. adulterati humores partem affectam actu rodentes, pro re natâ emendentur, temperentur, absorbeantur. 2°. Ne ulteriùs serpat edax ille morbus, prohibeatur.

VICTUS ratio, præsidia pharmaceutica, sæpè ferrum & ignis, indicationibus faciunt satis.

DIURETICA, nec non diaphoretica tùm salina volatilia, & salia volatilia oleosa, tùm alkalina terrea, acre acidum absorbentia, miram quandoque præstant opem, si quidem, hæsitantium in exilissimis Ossium vasis humorum, discussione maximè conducent. His utilissimè sociantur decocta sudorifera, quando præcipuè, cum carie concurrit lues venerea, cujus eradicatio, mercurio prudenter suscipienda.

PURGANTIA, si ab indicantibus postulata exhibeantur, blanda convenit catharsis, drasticaque, angue pejora, cautissimè vitentur.

NUNC immediatam partis cariosæ medelam exponamus. Morbi origine, gradu ac sede, sedulò detectis, apprimè noscet sanitatis minister, an facili, an verò difficili negotio & quânam ope, eradicari queat.

LEVIUSCULÆ sufficiunt linamenta arida, vel spirituosus imbuta medicamentis. Paulò profundiori, extersâ sanie, conducunt inspersi pulveres balsamici, radicis aristolochiæ rotundæ v, g. iridis Florentinæ, sabinæ, euphorbii, thuris, myrrhæ, &c. vel instillata olea exsiccantia ligni sancti, cinnamomi, caryophyllorum, vel essentiæ mastiches, myrrhæ, aloes, &c. pingua oleosa cautè arceantur, ut potequæ, inter poros Ossium admissa, rancorem contrahunt, morbumque adaugent.

AN extirpandæ cariei, aqua fortis, spiritus vitrioli, sulphuris, ut potè corrosiva, competant, inter auctores controver-

titur. Hæc reprobatur Doctissimus Heyne (a). A Pandolphio (b), Heistero & M. le Dran, commendantur. Utraque opinio rationibus suffulta, exemplis observationibusque illustratur. Litem dirimere, praxis haud improspera videtur. Itaque, quando ulcus à levi carie productum, carne luxuriante, molli, semperque recruDESCENTE impletur; tunc legitimum laudamus, cum clarissimo M. Louis (c), corrodentium usum, inter quæ, vel hydrargirum aquâ forti solutum, vel illinitio Hartmanni (d), cum mercurio dulci in aquâ plantaginis soluto, palmam præripiunt.

CARIES gravior, aliam suscipit medelam. Os vitiatum, haud infrequenter terebrâ perforandum. Si in aprico fuerit, limâ vel radulâ tantisper deradatur, donec sublati partibus cariosis, os undique album vel rubicundum, se præbeat.

QUANDO caries insatiata, atrociùsque sæviens, contra præscriptos artis aculeos recalcitravit; tunc fulmine Chirurgico, vitatis vitandis, servatisque servandis, quàm solertissimè, semel aut iterùm prore nratâ, aduratur pars affecta; quousquè spumans uvor, per poros exsudare desinat, ut tum demùm, squammæ abscedant non vi revellendæ, sed lentè & leniter, postquàm natura operculum quasi carneum sano ossi interjecit, separandæ.

EXESIS cranii ossibus, noxia ultio à prudentioribus Chirurgis improbatur; periculum est enim, ne membranæ cerebri, ipsumque cerebrum, lædantur. Idem fere statuendum de nonnullis mollioribus ac spongiosis ossibus; cujusmodi sunt, iterum, carpus, tarsus, &c. quæ ulationem non faciliè ferunt.

Post applicationem cauterii actualis, linamenta arida, vel spiritu vini madida, super os apponantur. Sequentibus verò diebus, balsamicis utendum, donec crusta, à lamellis ustis efformata, deciderit, & vitiatæ partes, subcrescente novâ carne, sint foràs eliminatæ.

AD medullam usque majorum Ossium, si penetraverit caries, suadente celfo (e), semel vel pluries, celebretur terebratio.

OSSA tenuiora carie affecta, quoad fieri poterit, fore eximenda, censemus.

CUM totam ossis substantiam, caries miserè depascitur, quod

(a) Tentamen de præcipuis Ossium morbis, &c.

(b) De ventositatè spina, c. 15.

(c) Videfis Thesim de carie Ossium in scholis Chirurgiæ propugnatam, præside M. Louis, anno 1752.

(d) Praxis Chymiatrica, cap. 204, p. 284.

(e) Lib. VIII, cap. 2 & 3.

vitiatum, omninò eximendum (a). Si inferior pars intacta sit, tantummodò quod corruptum est, excidatur.

QUANDò caries, os in articulo rodit, ita ut pars fiderata, excidi, eximi, vel aduri, salvâ parte sanâ, nequeat; tunc lucuosa, sed unica superest medicina, amputatio membri, si spes salutis affulgeat, instituenda.

(a) Heisteri Instit. Chirurg. tom. 1, p. 375.

HAS THESES DEO JUVANTE, & Præsidi M. JOANNE-BAPTISTA-GUILLELMO FERRAND, Facultatis Artium & Chirurgiæ Magistro, Regiæ Chirurgiæ Academiæ Socio, Regiæ Scientiarum, Litterarum & Artium Academiæ Rothomagensis Correspondente, nec non Scholarum Chirurgiæ practicarum Professore, *tueri conabitur*, JACOBUS COURTIN, *Parifinus*, *præclaræ Artium Facultatis Magister in Universitate Parifensi*, Regii Chirurgiæ Collegii candidatus, Theſeos Auct̃or.

P A R I S I I S,

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS,

Die lunæ 30^o. Decembris Anno salutis 1765, à ſeſqui-ſecundâ poſt meridiem ad ſeptimam.

PRO ACTU PÛBLICO

ET

MAGISTERII LAUREA.

Typis P. AL. LE PRIEUR, Regii Chirurg. Collegii
Typographi.